



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

15 MAR 2002 001532

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°4 du 7 mars 2002 - 1 page

COLZA : Charançon de la tige

Restez vigilant

CEREALES : Régulateur de croissance et désherbage

COLZA

Stade : Entre nœuds visibles (C2).

La végétation a peu évolué et on trouve couramment des allongements de tige de 5 à 15 cm.

Charançon de la tige

Les températures fraîches que l'on connaît depuis maintenant deux semaines n'ont pas permis une activité importante des charançons (seules quelques captures ont été faites en début de semaine). Néanmoins les premières piqûres de ponte ont été observées la semaine dernière dans des zones non traitées.

La plupart des parcelles ayant maintenant été protégée, il faut rester vigilant et bien surveiller d'éventuelles recolonisations jusqu'au stade « tige 20 cm ». Passé ce stade ce charançon est peu nuisible.

Si aucune intervention n'a été effectuée, intervenir d'urgence.

Dans les parcelles déjà protégées, surveillez vos cuvettes et réintervenez si vous avez de nouvelles captures.

Méligethes

Les premières captures ont été réalisées. Surveillez vos cuvettes.

Régulateur de croissance

Dans les situations à risques, appliquez Parlay C, Horizon ou Caramba entre le stade C2 et D1.

CEREALES

Stade : Trois feuilles (1.3) à épis 1 cm (5.1).

Régulateur de croissance

Rappel des conditions minimums pour une bonne efficacité du traitement C5 :

- température minimum supérieure à -1°C,
- température maximum supérieure à 10°C.

Ces conditions doivent être requises le jour du traitement et les trois jours suivants.

Si les conditions d'application ne sont pas réunies avant le stade épis 1 cm, il faut mieux s'orienter vers un produit dont les stades d'applications sont plus tardifs (ex : Terpal, Moddus, Mondium...).

Désherbage

Au stade mi-tallage de la céréale, la majorité des adventices sont maintenant levée. Seules quelques espèces à levée échelonnée type folle avoine vont encore germer. Les applications peuvent donc commencer.

Avant tout traitement, pensez à observer le stade des adventices pour adapter la dose et le produit à la situation de votre parcelle.

Maladies du pied

Les trois maladies les plus fréquentes (Piétin verse, Rhizoctone et fusariose) sont maintenant observées dans les semis les plus précoces. Un point complet sera réalisé le prochain bulletin.

Aucune intervention nécessaire pour le moment.

Service Régional de
la Protection des
Végétaux
Site de Marmilhat BP 45
63370 LEMPDES
Tél. 04.73.42.14.83
Fax 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station
d'Avertissements
Agricoles de la DRAF
AUVERGNE

Le Directeur gérant :
D. DIDELOT

Publication périodique
C.P.A.P n°2315AD
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 55 €
Fax : 50 €
Internet : 45 €

